

Konu: Biyolojik Risk Etmenleri

1. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında büyük bir dağılım göstererek insanlarla etkileşime giren ve zarar veren mikroorganizmalardandır?
 - a. Virüsler,
 - b. Mantarlar,
 - c. Protozoalar
 - d. Hepsi
2. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon etkenlerinin bulaşma yollarındandır?
 - a. Vektörler (etkeni taşıyan canlı konakçılar)
 - b. Ortak kullanılan giysi, araç ve gereçler
 - c. Kan ve kan ürünleri
 - d. Hepsi
3. Brusella'da aşağıdakilerden hangisi risk grubunda değildir?
 - a. Veterinerler
 - b. Mezbaha işçileri
 - c. Balıkçılar
 - d. Süt ürünü endüstrisinde çalışan işçiler
4. Aşağıdakilerden hangisi Brusella'nın vücuda girme yollarından değildir?
 - a. Solunum
 - b. Sindirim
 - c. Deri
 - d. Mukoza
5. Aşağıdakilerden hangileri Brusella'nın hastalık belirtilerinden değildir?
 - a. İştahsızlık
 - b. Kabızlık
 - c. Sık idrara çıkma
 - d. Ateş
6. Aşağıdakilerden hangisi Şarbonun bulaşma yollarındandır?
 - a. Sağlam insanlara deride açılan giriş kapıları
 - b. Şarbon sporlarının bulunduğu havanın solunması
 - c. Sindirim sistemi
 - d. Hepsi

7. Tetanozun vücuda girme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

- a. Deri ve mukoza
- b. Sindirim
- c. Solunum
- d. Hiçbiri

8. Aşağıdakilerden hangisi Leptospirozun bulaşma yollarından değildir?

- a. Bulaşmış su ve besin maddelerinin alınması
- b. Mukoza yolu
- c. Solunum yolu
- d. Deri yolu

9. Aşağıdakilerden hangisi Leptospirozda risk grubudur?

- a. Çiftçiler
- b. Balıkçılar
- c. Mezbaha işçileri
- d. Hepsisi

10. Aşağıdakilerden hangisi parenteral bulaşan hepatitlerden korunma için alınacak önlemler arasında sayılamaz?

- a. Kan ve vücut sıvıları ile temas eden cildi hemen su ve sabunla yıkamalı
- b. Kan ve vücut sıvılarının sıçrama riski varsa maske, gözlük ve önlük kullanılmalı
- c. İğneler kılıfına takılmalı
- d. Tüm hastaların kanları potansiyel olarak enfeksiyöz kabul edilerek, kan almada ve kanlı sıvılarla temasta eldiven giymeli

11. Aşağıdakilerden hangisi parenteral bulaşan hepatitlerden korunma için laboratuvarında alınacak önlemler arasındadır?

- a. Örnekler taşınma sırasında sızıntıyı önleyecek kapaklı kutulara konulmalı
- b. Kan ürünleriyle çalışırken ağız pipeti kullanılmamalı
- c. Hastadan materyalleri ile çalışanlar eldiven giymeli
- d. Hepsisi

12. Aşağıdakilerden hangisi parenteral bulaşan hepatitlerden korunma için diyaliz birimlerinde alınacak ilave önlemler arasındadır?

- a. HBsAg taşıyıcıları için farklı aygıtlar kullanılmalı
- b. Personel ve hastaların hepatit serolojisi 6 ayda bir kontrol edilmelidir
- c. Personel işlem sırasında eldiven giymeli

d. Hepsi

13. Aşağıdakilerden hangisi Hepatit B Aşısında antikor oluşumunu olumsuz etkileyen faktörlerden sayılamaz?

- a. İleri Yaş
- b. Sigara Kullanımı
- c. Zayıflık
- d. İmmünyetmezlik

14. Aşağıdakilerden hangisi Pandemik İnfluenzadan Korunma Önlemleri arasında sayılamaz?

- a. Hastaya 1 metre mesafe içinde mutlaka koruyucu gözlük kullanılmalıdır
- b. Hastalar için mümkünse aynı tıbbi cihazlar (steteskop, termometre vs) kullanılmalıdır.
- c. Hasta veya hastalar ayrı odalara alınarak damlacık ve temas izolasyonu yapılmalıdır
- d. Odaya girenler SARS ve tüberkülozda da kullanılan N-95 maskesi kullanmalıdır.

15. Sağlık çalışanlarında İnfluenza olasılığı varsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

- a. İnfluenza enfeksiyonu şüphesi kuvvetli ise oseltamivir tedavisi başlanmalıdır.
- b. Enfekte aerosoller, vücut salgı ve sıvıları ile teması olan sağlık çalışanlarına oseltamivir profilaksisi önerilir.
- c. Aerosolizasyon açısından yüksek risk taşıyan işlemler yapılacaksa sağlık çalışanlarına temas öncesi profilaksi önerilir.
- d. Hepsi

Cevap Anahtarı:

1d 2d 3c 4a 5c 6d 7a 8c 9d 10c 11d 12d 13c
14b 15d